



# Estudio uso de alcohol y otras drogas en población de 60 años o más

## PRINCIPALES RESULTADOS



Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENA)

Santiago, Agosto 2021.



## Ficha Técnica

- Encuesta telefónica a 3.503 personas de 60 años o más, en las 16 regiones del país.
- Representativa a nivel nacional.
- Periodo de aplicación: 6 de abril al 6 de mayo de 2021.
- Trabajo de campo: CADEM.
- Análisis de datos: Observatorio Nacional de Drogas.

## Características de la muestra



51,7% hombres y 48,3% mujeres.



70,0% entre 60 y 70 años y 30,0% de 71 años y más.



18,9% con educación básica o menos, 37,7% con educación media, 43,3% con educación superior o postgrado.

## Características de la muestra

49,1% vive con su familia, 28,1% vive con su pareja, 18,0% vive solo y 4,8% vive con otra persona.



40,7% trabajó al menos una hora la semana pasada.


22,4% de los desocupados ejerce el rol de cuidador de algún miembro de su familia.




39,0% se sintió triste la mayor parte del día o todos los días durante las últimas dos semanas.

# Módulo consumo de alcohol

# Consumo de alcohol (mes), según sexo, edad y educación (%)




# Consumidores de alcohol (mes) que declaran haberse embriagado\*, según sexo, edad y educación (%)




\* Embriaguez: 3 o más tragos para hombre, 2 o más tragos para mujeres en al menos una ocasión durante el último mes.

# Consumidores de alcohol (mes) que declaran haberse embriagado\*, según con quien vive, se ha sentido triste y ocupación (%)



\* Embriaguez: 3 o más tragos para hombre, 2 o más tragos para mujeres en al menos una ocasión durante el último mes.


# Consumidores de alcohol (mes) que declaran haberse embriagado\*, según apoyo social\* (%)



\* Embriaguez: 3 o más tragos para hombre, 2 o más tragos para mujeres en al menos una ocasión durante el último mes.

\*El apoyo social se calcula usando la escala Oslo-3, la que se construye en base a 3 preguntas (ayuda de vecinos, personas cercanas en quienes contar e interés que muestra la gente de su entorno) que forman un índice sumatorio que varía entre 3 y 14 puntos. Un puntaje de 3-8 puntos es apoyo social pobre, 9-11 es moderado y 12-14 es apoyo social alto.


# ¿Ha cambiado su consumo de alcohol desde el inicio de las restricciones por Covid-19? (%)



\* Sólo considera respuestas de consumidores de último año.


# Módulo consumo de medicamentos sin receta médica

# Consumo de **medicamentos sin receta médica (año)\***, según sexo, edad y educación (%)




\* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).

# Consumo de **medicamentos sin receta médica (año)\***, según con quien vive, se ha sentido triste y ocupación (%)



\* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).


# Consumo de medicamentos sin receta médica (año)\*, según apoyo social\* (%)



\* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).

\* El apoyo social se calcula usando la escala Oslo-3, la que se construye en base a 3 preguntas (ayuda de vecinos, personas cercanas en quienes contar e interés que muestra la gente de su entorno) que forman un índice sumatorio que varía entre 3 y 14 puntos. Un puntaje de 3-8 puntos es apoyo social pobre, 9-11 es moderado y 12-14 es apoyo social alto.


## Razones de consumo de medicamentos sin receta médica (año)\* (%)



\* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).

\* Se omiten respuestas "No sabe, no responde" y "Otra razón". Sólo considera respuestas de consumidores año.


## Fuente de obtención de medicamentos sin receta médica\* en consumidores de medicamentos (año) (%)



\* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).

\* Se omiten respuestas "No sabe, no responde" y "Otra forma". Sólo considera respuestas de consumidores año.

# ¿Ha cambiado su consumo de **medicamentos sin receta médica\*** desde el inicio de las restricciones por **Covid-19?** (%)




\* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).


\* Se omiten respuestas "No sabe, no responde". Sólo considera respuestas de consumidores de último año.

# Módulo consumo de marihuana

# Consumo de **marihuana (año)**, según sexo, edad y educación (%)




# Fuente de **obtención** de marihuana en consumidores de **marihuana (año)** (%)




\* Sólo considera respuestas de consumidores de último año.

# En el último año ¿Ha consumido **marihuana** por alguna de las siguientes vías? (%)



\* Se omite categoría "otros". Sólo considera respuestas de consumidores de último año. Pregunta de respuesta múltiple.

# ¿Ha cambiado su consumo de **marihuana** desde el inicio de las restricciones por **Covid-19**? (%)



\* Sólo considera respuestas de consumidores de último año.


# Módulo consumo de otras drogas

# Consumo de otras drogas (vida y año) (%)

### Prevalencia vida




### Prevalencia año



# Módulo percepción de riesgo

## Percepción de riesgo alto para alcohol y otras drogas (%)



# Principales conclusiones

## Principales conclusiones

- Los consumos más altos en las personas de 60 años y más, se registran en alcohol y medicamentos sin receta médica:
  - 2 de cada 5 personas manifiestan consumir alcohol en el último mes.
  - 2 de cada 3 consumidores de alcohol en el último mes manifiestan haberse embriagado.
  - 1 de cada 10 personas mencionan consumir medicamentos sin receta médica en el último año.
- Las personas de 60 años y más presentan un consumo bajo en otras sustancias (marihuana, cocaína, LSD, pasta base, éxtasis).
- Las restricciones del Covid-19 presentan un impacto bajo en el consumo de alcohol y otras drogas en personas de 60 años y más.



# SEDA



#eligevivir  
— SIN DROGAS —

