

Encuesta online efectos del COVID-19 en el uso de alcohol y otras drogas en Chile.

PRINCIPALES RESULTADOS

#eligevivir
— SIN DROGAS —



SENDA
Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

Gobierno de Chile

Área Estudios, Estadísticas y
Publicaciones


Julio 2020

Ficha Técnica


- Aplicación de cuestionario online a través de pagina web de SENDA y de Saludablemente.
- Fecha aplicación: desde 6 al 27 de junio 2020.
- Encuestas completadas: 34.738 en las 16 regiones del país.
- Encuestas validadas: 15.280 en las 16 regiones del país.
- 40,4% son hombres y 59,6% mujeres.
- 64,0% entre 18 y 39 años.
- Procesamiento de datos: Área de Estudios, Estadísticas y Publicaciones.




P1. Sexo (%)



P2. Edad (%)




P3. ¿Usted tiene hijos menores de edad? (%)



P4. ¿En qué región vive actualmente?

Región	N
Metropolitana	2.290
Maule	2.158
Antofagasta	1.529
Biobío	1.354
Valparaíso	1.220
Araucanía	994
Coquimbo	856
Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	757
Los Lagos	688
Los Ríos	633
Atacama	595
Arica y Parinacota	587
Aysén Gral. Carlos Ibáñez del Campo	446
Ñuble	438
Tarapacá	394
Magallanes y la Antártica Chilena	341
Total	15.280

P5. ¿Cuál de las siguientes medidas ha tenido que tomar como consecuencia de las restricciones del COVID-19? (%)



Aislamiento social (por ejemplo, no ha salido de su casa ni ha aceptado visitas sin que el gobierno lo solicitara) / Aislamiento en el hogar (por ejemplo, el gobierno pidió a todos que se quedaran en aislamiento en casa) / Cuarentena domiciliaria (dio positivo al COVID-19 y se quedó en casa) / Ingresado en el hospital (dio positivo al COVID-19 y fue ingresado en el hospital)


P6. ¿Con qué frecuencia usó las siguientes drogas en los últimos 30 días? (%)

	Menos de una vez por semana, pero al menos una vez al mes	Una vez a la semana	No diariamente, pero más de una vez por semana	Casi a diario	A diario
Alcohol	52,4	29,5	12,1	4,0	2,0
Marihuana	37,5	21,1	12,6	12,3	16,5
Cocaína	59,3	21,5	11,1	4,6	3,5
Medicamentos sin receta	59,8	20,6	8,3	5,0	6,3
LSD/ Éxtasis	75,8	13,4	4,7	2,6	3,5


Medicamentos SIN receta médica (como Clonazepam, Tramal, entre otros)

LSD/Éxtasis (u otra droga sintética)


P7. ¿Ha cambiado su consumo de ALCOHOL como resultado de las restricciones del COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)



P8. ¿Por qué ha disminuido su consumo de ALCOHOL como resultado de las restricciones del COVID- 19? (%):




P9. ¿Por qué ha aumentado su consumo de ALCOHOL como resultado de las restricciones del COVID-19? (%):




USO DE ALCOHOL FRENTE A HIJOS


P10. ¿Desde el inicio del COVID-19, ha consumido ALCOHOL en presencia de sus hijos/as u otros niños/as a su cuidado? (%)




P11. ¿Ha cambiado su uso de MARIHUANA como resultado de las restricciones del COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)




P12. ¿Por qué ha disminuido su consumo de MARIHUANA como resultado de las restricciones del COVID- 19? (%)




P13. ¿Por qué ha aumentado su consumo de MARIHUANA como resultado de las restricciones del COVID-19? (%)



P14. ¿Ha cambiado su uso de COCAÍNA como resultado de las restricciones del COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)




P15. ¿Ha cambiado su uso de MEDICAMENTOS SIN RECETA MÉDICA como resultado de las restricciones del COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)



Medicamentos SIN receta médica (como Clonazepam, Tramal, entre otros)


P16. ¿Ha cambiado su consumo de LSD/ÉXTASIS como resultado de las restricciones del COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)



LSD/Éxtasis (u otra droga sintética)

DEMANDA TRATAMIENTO POR ALCOHOL


P17. ¿Ha habido algún cambio en su intención de buscar algún tipo de ayuda o tratamiento para disminuir o dejar de consumir ALCOHOL desde que se introdujeron las medidas por el COVID 19? (%)



■ Aumento **■ Disminuye** **□ No hay cambios o no ha buscado**

DEMANDA TRATAMIENTO POR DROGAS


P18. ¿Ha habido algún cambio en su intención de buscar algún tipo de ayuda o tratamiento para disminuir o dejar de consumir DROGAS desde que se introdujeron las medidas del COVID 19? (%)



■ Aumento ■ Disminuye ■ No hay cambios o no ha buscado


ACCESO A ALCOHOL

P19. ¿Ha tenido dificultades para acceder a BEBIDAS ALCOHÓLICAS a causa del COVID-19? (%)




- Tuvo dificultades para comprar
- No tuvo dificultades para comprar

P20. ¿Ha cambiado la forma en que ha obtenido BEBIDAS ALCOHÓLICAS durante el COVID-19 en comparación con antes de las medidas de restricción? (%)




- Cambia su forma de comprar
- No cambia su forma de comprar

P21. ¿De qué manera ha cambiado la forma en que ha obtenido BEBIDAS ALCOHÓLICAS durante el COVID-19 en comparación con antes de las medidas de restricción? (%)




ACCESO A DROGAS


P22. ¿Ha obtenido/intentado obtener DROGAS desde el brote del COVID-19? (%)



P23. Pensando en la última vez que obtuvo DROGAS desde el brote del COVID-19, indique la droga obtenida (%)




P24. ¿Ha tenido dificultades para acceder a DROGAS a causa del COVID-19?




■ Tuvo dificultades ■ No tuvo dificultades

P25. ¿Ha cambiado la forma en que ha obtenido DROGAS durante el COVID-19 en comparación con antes de las medidas de restricción?




■ Cambia la forma de obtener drogas
■ No cambia la forma de obtener drogas

P26. ¿De qué manera ha cambiado la forma en que ha obtenido las DROGAS durante el COVID-19 en comparación con antes de las medidas de restricción? (%)



PRECIO DE DROGAS

P27. Desde el brote del COVID-19 y según lo que usted conoce, ¿ha habido algún cambio en precio de la droga que ha obtenido? (%)



FONO DROGAS Y ALCOHOL
1412
DESDE RED FIJA Y CELULARES



#eligevivir
— SIN DROGAS —